

ЗВІТ
про основні показники наукової діяльності у 1 кварталі 2024 року

Таблиця 2

	Найменування показників виконання завдання (стаття, патент, інформаційний лист, метод рекомендації, нововведення), конференції (програма)	Одиниця виміру	Очікувані результати	Фактично досягнуто
1	2	3	4	5
Дослідити:	Стаття – Zhdan V., Holovanova I., Wang Sh., Obrevko N., Korneta O., Bielikova I., Kaidashev I., Haque U., Khorosh M., Popovich I. ANALYSIS OF BEHAVIORAL FACTORS AND LEVEL OF ANXIETY OF SCHOOLCHILDREN IN THE CONDITIONS OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR. <i>Проблеми екології та медицини</i> .2023;5-6:51-58 DOI https://doi.org/10.31718/mep.2023.27.5-6 .	1	Дослідження поведінкових факторів та рівня тривожності школярів 11-17 років м. Кременчука в умовах війни.	Внутрішньо переміщені особи мали в 5,4 рази більше шансів ситуативної тривоги, ніж місцеві школярі (співвідношення шансів, ВШ=5,4, 95% довірчий інтервал, ДІ: 1,66-9,39, p=0,045). Рівень особистісної тривожності у дівчат у 6,6 разів був вищий, ніж у хлопців (ВШ=6,66, 95% ДІ: 2,79-15,92, p=0,028). Вживання шкідливої їжі було пов'язане з вищими шансами ситуативної тривоги в умовах війни (ВШ=3,11, 95% ДІ: 1,37-7,03, p=0,035). Дане дослідження свідчить про високе психологічне навантаження на українських дітей, особливо ВПО. Таким чином, постійний догляд за психічним здоров'ям протягом початкового періоду переселення є вкрай необхідним.
Дослідити:	Стаття - O.Ya.Vovk, I.A. Holovanova, Alla Podvin, I.U. Popovuch, O.V.Filatova, O. D. Havlovsky, N.O.Liakhova. CONTEXTUAL FACTORS ASSOCIATED WITH CERVICAL CANCER. <i>Лікарські відомості</i> . 2023;12:2687-2693. DOI: 10.36740/WLek202312119	1	Метою дослідження є визначення факторів ризику, що пов'язані з раком шийки матки.	У результаті дослідження виділено різні групи факторів, що збільшують ризик раку шийки матки у жінок. Соціально-економічні фактори, такі як низький рівень освіти, недостатня обізнаність щодо раннього виявлення рак шийки матки, незадовільний матеріальний стан жінки підвищують ризик раку шийки матки. Медико-демографічні фактори, такі як відсутність дітей, аборти в анамнезі, спадкова схильність підвищили шанси РШМ.
Дослідити:	Стаття – Ніколішина Е.В.,	1	Мета: провести аналіз	Ефективне протезування пацієнтів із генералізованим

дити:	Добровольська О.В., Ніколішин І.А., Добровольський О.В., Дворник В.М. Ортопедична реабілітація пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом за допомогою дентальної імплантації. <i>Український стоматологічний альманах</i> . 2023;4:48-53.		клінічної ефективності ортопедичної реабілітації з опорою на імпланти хворих на хронічний пародонтит.	пародонтитом визначається персоналізованим підходом до кожного окремого випадку з урахуванням місцевих факторів та індивідуальних особливостей організму.
-------	--	--	---	---

Зав. кафедрою
терапевтичної стоматології,
д.мед.н, професорка

Тетяна ПЕТРУШАНКО